

Johnson & Johnson



Conoce el dispositivo DE TREMFYA®

Guía de administración
subcutánea de guselkumab¹

Indicado para el tratamiento de pacientes adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave que hayan tenido una respuesta inadecuada, presenten pérdida de la respuesta o sean intolerantes al tratamiento convencional o a un tratamiento biológico.¹ Indicado para el tratamiento de pacientes adultos con enfermedad de Crohn activa de moderada a grave que hayan tenido una respuesta inadecuada, presenten pérdida de la respuesta o sean intolerantes al tratamiento convencional o a un tratamiento biológico.¹

Guía de administración subcutánea de guselkumab¹

La administración SC reduce el tiempo de dosificación vs. IV³



SC: 1-5 minutos
(promedio: 3,3 minutos)



IV: 30-90 minutos

Precauciones y conservación con dispositivo PushPen pluma precargada⁴



Conservar en la nevera entre 2 y 8 °C



Es para un único uso



No congelar



No utilizar después de la fecha de caducidad o si el precinto del envase está roto



No agitar



Sacar de la nevera el envase de cartón y poner en una superficie plana a temperatura ambiente durante aproximadamente 30 minutos antes del uso



Conservar la pluma precargada en el embalaje exterior para protegerla de la luz



No calentar la pluma precargada de ninguna otra forma


Conoce el dispositivo PUSHPEN

Guía de administración
subcutánea de guselkumab¹

PUSHPEN

- ✓ Autoinyector de 2 pasos²
- ✓ Administración al apretar contra la piel²
- ✓ Señal audible y visual con clics y gran ventana de visualización²
- ✓ Forma cuadrada antigiro²
- ✓ Capacidad de 2 ml²

Pasos para administrar el dispositivo PushPen^{^4}



Pluma precargada a simple vista. Imagen extraída del prospecto.⁴

1 Reunir todos los materiales

PushPen + Contenedor de objetos punzantes + Algodones impregnados de alcohol + Esparadrapo

2 Preparar la pluma precargada para su uso

Atemperar la pluma durante **al menos 30 minutos** antes de su uso

3 Preparar la inyección

Sacar la pluma precargada del envase de cartón. Compruebe el **líquido en la ventana de visión**, ha de ser **transparente o de color amarillo claro** y puede contener partículas diminutas translúcidas o blancas. También pueden verse burbujas de aire. Esto es normal. **No inyectar si el líquido está turbio o presenta un cambio de color o contiene partículas grandes.**

4 Escoger el lugar de la inyección

Recuerde que la vía de administración es **subcutánea. NO inyectar:**

- A 5 cm alrededor del ombligo.
- En la piel dolorida, con hematomas o roja.
- En la piel endurecida, descamada.
- En cicatrices o estrías.

Inyectar en la parte delantera de los muslos, en la parte inferior del abdomen o en la parte posterior de la parte superior del brazo si un cuidador le pone la inyección.

5 Retirar el capuchón

¡No toque el protector verde de la aguja! Esto puede iniciar la inyección y no recibirá la dosis. Tirando hacia fuera; es normal que aparezcan algunas gotas de líquido. **Inyecte en los 5 minutos siguientes.** No vuelva a colocar el capuchón y no utilice la pluma si se cae tras retirarlo.

6 Inyectar el PushPen

Coloque la pluma **directamente sobre el punto de inyección**, con el **protector verde de la aguja contra la piel** y la **ventana de visualización hacia usted.** **No levante la pluma durante la inyección**, ya que el protector de la aguja se bloqueará y no se administrará la dosis completa.

1er clic!

Oirá un **primer clic.** Mantenga la pluma firmemente contra la piel durante unos 10 segundos hasta oír un **segundo clic.**

10 SEG

2º clic!

La inyección estará completa cuando el **vástago amarillo** deje de moverse y **llene la ventana de visualización.**


Levántelo recto.

7 Compruebe el lugar de inyección

Puede aparecer una **pequeña cantidad de sangre o líquido**; presione suavemente con una gasa o algodón hasta que se detenga. **No frote** el lugar. Si es necesario, cúbralo con una venda.

8 Tire la pluma utilizada y el capuchón

Deseche la pluma precargada utilizada y el capuchón en un recipiente para objetos punzantes. Cuando el recipiente esté lleno, elimínelo según las instrucciones de su médico o enfermero. **No tire la pluma en la basura doméstica ni recicle el recipiente para objetos punzantes.**




Habla con el paciente y comparte con el médico cuando:

- El paciente refiere **reacciones intensas o persistentes en el lugar de inyección** (enrojecimiento, dolor o irritación).
- Aparecen **habones o erupción cutánea** tras la administración.
- Refiere **signos de infección**, como infecciones de las vías respiratorias.
- Comunica **incidencias con el dispositivo** (conservación inadecuada, congelación, daños visibles o uso fuera de fecha).
- Existen **dudas sobre la correcta administración** o el paciente no se siente seguro para autoinyectarse.
- Es importante que el paciente **no intente la autoinyección** hasta no haber sido **formado por el médico o personal de enfermería.**

⁴Para consultar la información completa acerca del manejo y administración de la pluma, ver información de "Instrucciones de Uso" contenida en el prospecto dentro del envase.⁴

IL: interleucina; IV: intravenoso; SC: subcutáneo.

Misma posología de inducción y mantenimiento en EC y CU^{1,5}



Representación gráfica construida en base a la Ficha Técnica¹.

¹Para más información sobre la dosis de mantenimiento consulte la sección 4.2 Posología y forma de administración de la ficha técnica y para más información sobre seguridad consulte la sección 4.8 Reacciones adversas.¹ *En PushPen o jeringa precargada. [#]En pluma precargada o jeringa precargada.

c4s: cada 4 semanas; **c8s:** cada 8 semanas; **CU:** colitis ulcerosa; **EC:** enfermedad de Crohn; **IV:** intravenoso; **SC:** subcutáneo.

1. Ficha técnica. https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1171234002/FT_1171234002.html. **2.** ONdrugDELIVERY. Success factors for the YpsoMate family of autoinjectors. Disponible en: <https://www.ondrugdelivery.com/success-factors-for-the-ypso-mate-family-of-autoinjectors>. Última consulta: febrero 2026. **3.** Bittner B, et al. Subcutaneous Administration of Biotherapeutics: An Overview of Current Challenges and Opportunities. BioDrugs. 2018 Oct;32(5):425-440. doi: 10.1007/s40259-018-0295-0. **4.** Prospecto. **5.** Pugliano CL et al. Practical considerations for the use of IL-23p19 inhibitors in inflammatory bowel disease: how to choose between them and why it matters? J Crohn Col 2025;9(8):jjaf144. doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjaf144.



Para mayor información, consultar el prospecto incluido en el envase.

Este es un material informativo destinado a facilitar la instrucción sobre el uso/administración de un medicamento basado en la información del producto autorizado por las Autoridades Sanitarias. En cumplimiento de la legislación sobre propiedad intelectual, el contenido al que Ud. va a acceder es para su uso exclusivo según los fines mencionados anteriormente, y no se permite su utilización de otro modo o para otros propósitos, la distribución a terceros en cualquier forma de todo o parte de la información y/o contenido.

CP-568820-Abril 2026 - Janssen Cilag, S.A.

Johnson & Johnson